

GLP-1 수용체 작용제 초진 문진표

GLP-1 RA Initial Assessment — 마운자로 (Mounjaro / Tirzepatide) · 위고비 (Wegovy / Semaglutide) 처방 전 안전성 확인을 위해 정확하게 작성해 주세요.



성명 (Name) _____ 생년월일 (DOB) _____ 작성일 (Date) _____

1. 신체계측 (Anthropometrics) · 성별 · 연락처

성별 (Sex) ☐ 남 (M) ☐ 여 (F) 연락처 _____
신장 / 체중 키 _____ cm 체중 _____ kg BMI _____ 목표체중 _____ kg 허리둘레 _____ cm

2. 금기사항 확인 (Contraindications) · 해당 시 처방 불가

아래 항목에 해당하면 GLP-1 수용체 작용제(마운자로 · 위고비 · 삭센다 등)를 투여할 수 없습니다.

- ☐ 갑상선 수질암 (Medullary Thyroid Carcinoma) 본인 병력 ☐ 갑상선 수질암 가족력
☐ 다발성 내분비 종양 2형 (MEN2) 본인 또는 가족력 ☐ 급성 췌장염 (Acute pancreatitis) 병력
☐ 현재 임신 중 (Pregnancy) ☐ 수유 중 (Breastfeeding) ☐ 임신 계획 중 (Planning pregnancy)

* 위 항목 중 하나라도 해당되면 작성 즉시 의료진에게 알려주세요. 처방이 불가능할 수 있습니다.

3. 만성질환 및 과거 병력 (Comorbidities) · 해당 모두 체크

- ☐ 고혈압 (HTN) ☐ 당뇨병 (DM) ☐ 고지혈증 (Dyslipidemia) ☐ 갑상선질환 (Thyroid) ☐ 심장질환 (CVD) ☐ 수면무호흡 (OSA)
☐ 위장질환 (GI) ☐ 신장질환 (CKD) ☐ 간질환 (Liver dz) ☐ 담석/담낭 (Gallstone) ☐ 우울/불안 (Depression/Anxiety)
☐ 위마비 (Gastroparesis) ☐ 예정된 수술·수면내시경 기타: _____

4. 현재 복용 약물 (Current Medications) · 알레르기 (Allergies)

현재 복용 약물 ☐ 없음 ☐ 있음 → 약 이름: _____
약물 / 주사 알레르기 ☐ 없음 ☐ 있음 → 약물명·증상: _____
피부 알레르기 (주사 부위 발진 등) ☐ 없음 ☐ 있음 → 부위·증상: _____

5. GLP-1 수용체 작용제 사용 경험 (Prior GLP-1 RA Use) · 미사용 시 표 비워둠

약물명 (Drug)	사용	최대 용량	사용 기간	부작용 (Side effects)
삭센다 (Saxenda / Liraglutide)	☐			
위고비 (Wegovy / Semaglutide)	☐			
마운자로 (Mounjaro / Tirzepatide)	☐			
기타: _____	☐			

* 부작용 예시: 오심·구토, 설사, 변비, 복통, 주사부위 반응, 두통 등

6. 체중 관리 이력 (Weight Hx) · 생활습관 (Lifestyle)

이전 감량 시도 ☐ 식이 ☐ 운동 ☐ 한약/보조제 ☐ 경구 비만약 ☐ 주사치료 ☐ 수술 (위밴드 등)
최대 _____ kg / 기간 _____
증가 시기 / 운동 ☐ 소아기 ☐ 청소년기 ☐ 성인 이후 ☐ 출산 후 ☐ 운동 안 함 ☐ 주 1-2회 ☐ 주 3-4회 ☐ 주 5회+
식습관 / 음주 ☐ 규칙적 ☐ 불규칙 ☐ 과식/야식 ☐ 감정적 식사 하루 _____ 회 ☐ 음주 안 함 ☐ 음주 (주 _____ 회)

위 내용을 사실대로 기재하였으며, GLP-1 수용체 작용제 (GLP-1 RA) 치료의 효과·부작용·금기사항에 대한 설명을 들었습니다.

환자 서명 (Signature) _____

